












| Tipo di ugello | Aspirazione d'aria | | Convenzionale | | | | | Deriva ridotta (pre-orifizio) | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design dell'ugello | Ventaglio piatto | | Ventaglio | | | Cono vuoto | | Ventaglio | | Ventaglio inclinato | |
| Qualità di spruzzo | "Più fini" | "Più grandi" | Fini | Medie | Grandi | Fini | Medie | Medie | Grandi | Medie | Grandi |
| Potenziale di deriva previsto | Basso | Basso | Alto | Medio-basso | Basso | Alto | Alto | Basso | Basso | Medio | Basso |
| HYPRO[®] Esempio di ugello <i>(Utilizzare la tabella degli ugelli Hypro per scegliere l'ugello più adeguato in termini di pressione e dimensioni)</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Guardian Air* | ULD/Drift Beta | Ventaglio Hypro e ventagli VP | | | Cono vuoto | Disco e cono | Hypro | Lo-Drift | Guardian | |
| Diserbanti che agiscono sul terreno | | | | | | | | | | | |
| Pre-emergenza e post-emergenza precoce | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Diserbanti che agiscono sul fogliame | | | | | | | | | | | |
| Erbe piccole (< 3 foglie) | | | ▲▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | | | | |
| Erbe (> 3 foglie) | ▲ | | ▲ | ▲▲ | | | | ▲ | | ▲ | |
| Infestanti a foglie larghe (larghezza max 2 cm) | | | ▲▲ | ▲▲ | | | | | | | |
| Infestanti a foglie larghe (larghezza 2 - 5 cm) | ▲▲ | | ▲ | ▲▲ | | | ▲ | | | ▲ | |
| Infestanti a foglie larghe (larghezza > 5 cm) | ▲▲▲ | | | ▲▲ | | | ▲ | ▲ | | ▲ | |
| Infestanti grandi: non selettivo (ad es. glifosato) | ▲▲▲ | ▲ | | ▲▲ | ▲ | | | ▲▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Fitoregolatori per cereali e anticrittogamici contro il mal del piede | | | | | | | | | | | |
| Pre- e post-GS32 | ▲▲▲ | | | ▲▲ | | | | ▲ | | ▲ | |
| Anticrittogamici per cereali | | | | | | | | | | | |
| T ₀ - fino a GS23 | ▲▲ | | ▲ | ▲▲ | | | ▲ | ▲ | | ▲ | |
| T ₁ e T ₂ - GS 24-49 | ▲▲▲ | ▲ | ▲ | ▲▲ | | | ▲ | ▲ | | ▲ | |
| T ₃ - dopo GS50 (irrorazione delle spighe) | ▲▲▲ | | | ▲▲ | | | ▲ | | | | |
| Insetticidi per cereali | | | | | | | | | | | |
| Autunno | ▲ | | ▲ | ▲▲ | | | ▲ | | | | |
| Irrorazione delle spighe | ▲▲ | | ▲▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | | | | |
| Anticrittogamici per la colza da olio | | | | | | | | | | | |
| Fase vegetativa | ▲ | | ▲ | ▲▲ | | | ▲ | ▲ | | ▲ | |
| Dalle gemme verdi | ▲▲▲ | | ▲ | ▲▲ | | | ▲ | ▲ | | ▲ | |
| Insetticidi per la colza da olio | | | | | | | | | | | |
| Fase vegetativa | | | ▲ | ▲▲ | | | ▲ | | | | |
| Dalle gemme verdi | ▲▲▲ | | ▲▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | | | | |